

# DEPTIL MYCOCIDE S

DATE DE MISE A JOUR : 15/11/22

**Liquide concentré à usage exclusivement professionnel**  
**INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES – AUTRES INDUSTRIES (INDUSTRIES COSMÉTIQUES, PHARMACEUTIQUES) - ZONES MÉDICALES, PRATIQUE VÉTÉRINAIRE**  
**DÉSINFECTANT À BASE D'AMMONIUM QUATERNAIRE POUR SURFACES ET ÉQUIPEMENTS**  
**DANS LES APPLICATIONS DE MOUSSE, DE PULVÉRISATION ET DE TREMPAGE**

## Caractéristiques physico-chimiques :

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Aspect                   | Liquide limpide                          |
| Couleur                  | Incolore                                 |
| Odeur                    | Caractéristique                          |
| pH pur                   | 7,5±0,7                                  |
| pH à 10g/l               | 7,5±0,5                                  |
| Masse volumique          | 0,98±0,01 g/cm <sup>3</sup>              |
| Point de congélation     | -4 °C                                    |
| Solubilité dans l'eau    | Soluble dans l'eau en toutes proportions |
| Point d'éclair (CE : A9) | 54 °C                                    |

## Critères environnementaux :

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Phosphore                         | < 0.1 %                                 |
| Azote                             | 0,4 %                                   |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 231 grammes de dioxygène par kilogramme |

## Propriétés :

Désinfectant  
Moussant  
Peu sensible à la présence de substances interférentes  
Mouillant

## Application :

Désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et virucide  
Par sa teneur en ammonium quaternaire, DEPTIL MYCOCIDE S risque d'opacifier le plexiglas par un phénomène de dépolymérisation.

## Mode d'emploi :

Nettoyer et rincer au préalable le matériel et les surfaces.  
Appliquer DEPTIL MYCOCIDE S au canon à mousse, par pulvérisation ou par trempage.  
Concentration:  
- 0,5% (5 ml DEPTIL MYCOCIDE S pour 1 litre d'eau) pour une activité bactéricide et levuricide  
- 0,1% (1 ml DEPTIL MYCOCIDE S pour 1 litre d'eau) pour l'activité virucide (bactériophages)  
Temps de contact :

# DEPTIL MYCOCIDE S

DATE DE MISE A JOUR : 15/11/22

- 30 minutes (selon le process) pour une activité bactéricide et levuricide
  - 15 minutes (selon le process) pour l'activité virucide (bactériophages)
- Température :  $\geq 20^{\circ}\text{C}$  (selon le process)  
Rinçage final à l'eau potable  
Nettoyer régulièrement le matériel d'application.

La (Les) concentration(s) indiquée(s) dans ce représente(nt) la (les) concentration(s) biocide(s) recommandée(s) obtenue(s) grâce aux tests d'efficacité réalisés en laboratoire. Toutefois, la concentration d'application sur le terrain peut être adaptée en fonction des conditions relevées sur site. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur privilégié.

## **Paramètres de contrôle :**

Merci de vous rapprocher de votre conseiller pour toute demande relative aux paramètres de contrôle.

## **Conditionnements :**

|          |       |                   |        |
|----------|-------|-------------------|--------|
| Jerrican | 22l   | Neutre            | 22kg   |
| Fût      | 220l  | Bleu foncé        | 210kg  |
| GRV      | 1000l | Couleur naturelle | 1000kg |

Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.  
Stocker dans un endroit propre, frais et ventilé et loin des sources de chaleur et de lumière intense.

## **Qualité - Sécurité :**

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur INTERNET : <http://www.kersia-group.com>  
Utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

## **Réglementation**

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Ce produit est utilisable en Agriculture Biologique conformément à la réglementation en vigueur.

DEPTIL MYCOCIDE S est un mélange conforme au règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH), quel que soit le site de fabrication.

Les substances concernées par le Règlement REACH et contenues dans DEPTIL MYCOCIDE S ont été pré-enregistrées ou enregistrées par notre société ou par nos fournisseurs en amont.

DEPTIL MYCOCIDE S ne contient pas de substance dite "extrêmement préoccupante" dans la liste actuelle des substances candidates à l'autorisation publiée et mise à jour régulièrement par l'ECHA.

# DEPTIL MYCOCIDE S

DATE DE MISE A JOUR : 15/11/22

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

PRODUIT BIOCIDES - N° Inventaire Ministère de l'Ecologie : 69690

Substance(s) active(s) pour 100g de produit : Chlorure de didécylidiméthylammonium 10g

GROUPE 1 : Désinfectants et produits biocides généraux; Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux; Type de produits 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

Homologation bactéricide n° 9200340 délivrée par le Ministère de l'Agriculture : à la concentration de pour 5 min de temps de contact

Matériel de laiterie, Animaux domestiques - locaux de préparation de la nourriture, Animaux domestiques - Matériel de transport de la nourriture, Locaux de stockage (P.O.V), Matériel de stockage (P.O.V), Matériel de transport (P.O.V), Locaux de stockage (P.O.A), Matériel de transport (P.O.A),

## Efficacité

| Activité    | Norme    | Organisme(s) testé(s)                                                               | Substance(s) interférente(s) | Temps de contact: | Température: | Concentration: |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Bactéricide | EN 1276  | Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | 0,3 g/l albumine bovine      | 5min              | 20°C         | 0,2%           |
|             |          |                                                                                     | lait écrémé 1%               | 5min              | 20°C         | 3%             |
|             | EN 13697 | Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa | 3 g/l albumine bovine        | 5min              | 18-25°C      | 0,2%           |
|             |          |                                                                                     | lait écrémé 1%               | 15 min            | 20°C         | 3%             |
| Fongicide   | EN 13697 | Aspergillus niger = Aspergillus brasiliensis                                        | 3 g/l albumine bovine        | 15 min            | 18-25°C      | 0,2%           |
| Levuricide  | EN 13697 | Candida albicans                                                                    | 3 g/l albumine bovine        | 15 min            | 18-25°C      | 0,2%           |
|             |          |                                                                                     | lait écrémé 1%               | 15 min            | 20°C         | 1%             |
|             | EN 1650  | Candida albicans                                                                    | 0,3 g/l albumine bovine      | 15 min            | 20°C         | 0,05%          |
|             |          |                                                                                     | lait écrémé 1%               | 15 min            | 20°C         | 1%             |
| Virucide    | EN 13610 | phages P001 et P008, lytiques pour Lactococcus lactis sp. lactis                    | petit lait 1%                | 15 min            | 20°C         | 0,1%           |
|             | EN 13697 |                                                                                     | petit lait 1%                | 15 min            | 18-25°C      | 0,1%           |